

К. В. Климова, Н. А. Чикалина, 6 курс, лечебный факультет
ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом акушерства и гинекологии ФДПО
Научный руководитель: асс. С. Ю. Досова

ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА ЖЕНЩИНЫ И ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ С РАЗВИТИЕМ АНОМАЛИЙ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ

Цель исследования: определение основных особенностей акушерско-гинекологического анамнеза женщины и особенностей течения беременности, предрасполагающих к развитию аномалий прикрепления плаценты и лохиометры как осложнений последового и послеродового периодов.

Материалы и методы: ретроспективный анализ 785 историй самопроизвольных родов в ГБУЗ «Областной родильный дом» г. Твери (январь 2014 — январь 2015 гг.). Вероятность взаимосвязи предрасполагающих факторов и возникновения исследуемых осложнений оценивалась по коэффициенту Пирсона (χ^2).

Результаты: перенесенные инфекционно-воспалительные заболевания среди женщин с аномалиями прикрепления плаценты встречались в 9 случаях (41 %), $P^{1-3} > 0,05$ — сила связи данного фактора и возникшего осложнения последового периода незначительная. Предшествующие медикаментозные аборт среди женщин с аномалиями прикрепления плаценты встречались в 10 случаях (45 %), $P^{1-3} > 0,05$ — сила связи данного фактора и возникшего осложнения последового периода незначительная. Предшествующие выскабливания полости матки (в т.ч. медицинские аборт) среди женщин с аномалиями прикрепления плаценты встречались в 2 случаях (9 %), $P^{1-3} < 0,01$ — сила связи данного фактора и возникшего осложнения последового периода слабая, что говорит о возможности влияния выскабливания на возникновение различных вариантов аномалий прикрепления плаценты. Перенесенные инфекционно-воспалительные заболевания среди женщин с лохиометрой встречались в 32 случаях (36 %), $P^{2-3} > 0,05$ — сила связи данного фактора и возникшего осложнения послеродового периода незначительная. Предшествующие медикаментозные аборт среди женщин с лохиометрой встречались в 25 случаях (28 %), $P^{2-3} > 0,05$ — сила связи данного фактора и возникшего осложнения послеродового периода незначительная. Предшествующие выскабливания полости матки (в т.ч. медицинские аборт) среди женщин с лохиометрой встречались в 6 случаях (7 %), $P^{2-3} < 0,01$ — сила связи данного фактора и возникшего осложнения послеродового периода слабая, что говорит о возможности влияния выскабливания на возникновение лохиометры.

Выводы: наличие выскабливаний полости матки (в т.ч. медицинские аборт) в акушерско-гинекологическом анамнезе женщины является предрасполагающим фактором к развитию различных вариантов аномалий прикрепления плаценты и лохиометры в III периоде родов и послеродовом периоде соответственно.